

## Carte de Rappel Patient

  
**infiximab**

Ce document est diffusé  
sous l'autorité de l'ANSM

Montrez cette carte à  
tous les médecins  
impliqués dans votre  
traitement.

Si vous ressentez un quelconque  
effet indésirable, parlez-en à  
votre médecin, pharmacien ou  
infirmier/ère.

Ceci s'applique aussi à tout effet  
indésirable qui ne serait pas  
mentionné dans la notice  
d'information. Vous pouvez  
également déclarer les effets  
indésirables directement via le  
portail de signalement des  
événements sanitaires  
indésirables du ministère  
chargé de la santé :  
<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Date de préparation : 01/2023  
FLX-(PAC)-FR-V4.0  
2023/01-Biogen-197183



Liste des allergies :

-----  
-----  
-----

Demandez à votre  
médecin de noter le  
type et la date du (des)  
dernier(s) test(s) de  
dépistage de la  
tuberculose ci-dessous :

Test :

Date :

Résultat :

de lot de votre  
médicament.

Assurez-vous d'avoir  
également avec vous une  
liste de tous les autres  
médicaments que vous  
utilisez lors de chaque  
visite auprès d'un  
professionnel de santé.

Liste des autres  
médicaments :

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

après votre dernière  
dose.

Date d'instauration du  
traitement par Flixabi :

-----  
-----  
-----

Administrations  
actuelles :

-----  
-----  
-----

Il est important que  
vous et votre médecin  
consigniez le nom de  
marque et le numéro

Nom du patient :

-----

Nom du médecin :

-----

Numéro de téléphone  
du médecin :

-----

Gardez cette carte sur  
vous pendant 4 mois  
après votre dernière  
dose de Flixabi, ou  
en cas de grossesse  
pendant 12 mois après  
la naissance de votre  
bébé. Les effets  
indésirables peuvent  
survenir longtemps

Cette carte de rappel patient contient des informations importantes de sécurité que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par Flixabi.

Veillez lire attentivement la “Notice” de Flixabi avant de commencer à utiliser ce médicament.

Cette liste des effets indésirables possibles associés à Flixabi n’est pas exhaustive.

## **Infections**

### **Avant le traitement par Flixabi**

- Veuillez informer votre médecin si vous présentez une infection, même si elle est très légère.
- Il est très important d’informer votre médecin si vous avez déjà présenté une tuberculose ou si vous avez été en contact avec une personne ayant déjà présenté une tuberculose. Votre médecin vous prescrira des tests pour voir si vous avez la tuberculose.

Demandez à votre médecin de noter le type et la date de votre (vos) dernier(s) test(s) de dépistage de la tuberculose sur la carte.

- Veuillez informer votre médecin si vous souffrez de l’hépatite B ou si vous savez ou suspectez que vous êtes porteur du virus de l’hépatite B.

### **Pendant le traitement par Flixabi**

- Veuillez informer votre médecin immédiatement si vous présentez les

signes d’une infection. Les signes incluent de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux (persistante), un essoufflement, une perte de poids, des sueurs nocturnes, une diarrhée, des plaies, des problèmes dentaires, des brûlures à la miction ou des symptômes “pseudo-grippaux”.

## **Grossesse, allaitement et vaccinations**

- Si vous avez reçu Flixabi pendant votre grossesse ou si vous

allaitez, il est important d’en informer votre pédiatre avant que votre bébé ne reçoive un vaccin. Votre bébé ne doit pas recevoir de “vaccin vivant”, comme le BCG (utilisé pour prévenir de la tuberculose) dans les 12 mois suivant la naissance ou pendant que vous allaitez, sauf avis contraire de votre pédiatre.